Este folleto explica cómo preparar dosis de emergencia de

Ciprofloxina

para bebés y niños expuestos al ántrax

Una vez que Usted haya sido notificado por las autoridades federales, estatales y locales que la población ha sido expuesto a ántrax, puede ser necesario que prepare pastillas de ciprofloxina para hacer algunos dosis de ***emergencia*** *de ciprofloxina para bebés y niños.*

Usted necesitará:

- Una pastilla de (1) 500 miligramos (mg) de ciprofloxacina
- Una cucharilla de metal
- Cucharas de medir [1 cucharilla; and ½ cucharilla]
  (NOTA: cucharas de medir son preferibles; no obstante, si no están disponibles, se puede usar la cuchara de metal para moler, medir y administrar la medicina)
- 1 tazón pequeño
- Agua
- Una de las siguientes comidas o bebidas:
  - almíbar de chocolate
  - almíbar de arce
  - marmelada de fresa
  - jugo de manzana

Directions:

1. Ponga una (1) tableta de ciprofloxina de 500 mg. dentro del tazón. Agregue dos (2) cucharillas niveladas de agua. Mezcle el agua y la pastilla durante un minuto. Aplaste la pastilla con el dorso de la cuchara hasta que ya no se vea pedazos grandes.

2. Agregue cuatro (4) cucharillas de una bebida o comida a la mezcla de ciprofloxina y agua. Revuélvalas hasta que la droga esté bien disuelta.

Cuánta mezcla de ciprofloxina hay que suministrar al niño

La cantidad de cucharillas de la mezcla de ciprofloxina suministrada al niño depende del peso del niño. **Si no se conoce el peso del niño, hay que pesarlo antes de suministrar la primera dosis.** La tabla explica cuánta dosis de Ciprofloxina se debe dar al niño de acuerdo con su peso. Se debe suministrarle dos dosis diarias (una por la mañana y una por la tarde.)

Si el niño pesa	Suministre
4 - 6.5 libras	**Media (1/2) cucharilla** de la mezcla de ciprofloxina
7 - 12.5 libras	**Una (1) cucharilla** de la mezcla de ciprofloxina
13 - 18.5 libras	**Una cucharilla y media (1 ½)** de la mezcla de ciprofloxina
19 - 24.5 libras	**Dos (2) cucharillas (tsp)** de la mezcla de ciprofloxina
25 - 30.5 libras	**Dos cucharillas y media (2 ½)** de la mezcla de ciprofloxina
31 - 37 libras	**Tres (3) cucharillas** de la mezcla de ciprofloxina
37.5 – 43 libras	**Tres cucharillas y media (3 ½)** de la mezcla de ciprofloxina
43 - 49 libras	**Cuatro (4) cucharillas** de la mezcla de ciprofloxina
49.5 – 55 libras	**Cuatro cucharillas y media (4 ½)** de la mezcla de ciprofloxina
55.5 - 61.5 libras	**Cinco (5) cucharillas** de la mezcla de ciprofloxina
62 - 67.5 libras	**Cinco cucharillas y media (5 ½)** de la mezcla de ciprofloxina
68 - 73.5 libras	**Seis (6) cucharillas** de la mezcla de ciprofloxina
Niños que pesan más de 73.5 libras que han sido expuestos al ántrax deben tomar uno (1) pastilla de 500 mg. de ciprofloxina dos veces diarias (a la misma hora del día, si es posible) durante 60 días. Si el niño no se puede tragar las pastillas, siga las indicaciones previas para preparar una mezcla y déle 4 cucharillas dos veces diarias.	

Como se debe almacenar la mezcla de ciprofloxina preparada

- Ciprofloxacina mezclada con cualquiera de las bebidas o comidas recomendadas se mantendrá fresca por lo menos 24 horas.
- Guarde la mezcla en un recipiente cubierto dentro de la nevera.
- Las mezclas hechas con jugos pueden ser guardadas al clima.

MDCH-OPHP October 2006